

# Questionnaire IIEF (International Index of Erectile Function)

## Questionnaire destiné au patient

**Instructions:** *Ces questions portent sur les effets que vos problèmes d'érection ont eus sur votre vie sexuelle au cours des 4 dernières semaines. Veuillez répondre aux questions suivantes aussi honnêtement et aussi clairement que possible. Pour répondre à ces questions, les définitions suivantes sont d'application:*

- **activité sexuelle:** rapport sexuel, caresses, préliminaires, masturbation.
- **rapport sexuel:** pénétration vaginale de la partenaire (vous avez pénétré votre partenaire)
- **stimulation sexuelle:** situations telles que préliminaires avec une partenaire, le fait de regarder des images érotiques etc.
- **éjaculation:** éjection (ou sensation d'éjection) de sperme hors du pénis

Cochez **UNE SEULE** case par question:

1. Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous pu obtenir une érection pendant une activité sexuelle?

- [0] Aucune activité sexuelle
- [1] Presque jamais ou jamais
- [2] Quelques fois (beaucoup moins que la moitié du temps)
- [3] Parfois (environ la moitié du temps)
- [4] La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)
- [5] Presque toujours ou toujours

2. Au cours des 4 dernières semaines, lorsque vous avez eu une érection lors d'une stimulation sexuelle, combien de fois vos érections ont-elles été suffisamment rigides pour permettre la pénétration?

- [0] Aucune activité sexuelle
- [1] Presque jamais ou jamais
- [2] Quelques fois (beaucoup moins que la moitié du temps)
- [3] Parfois (environ la moitié du temps)
- [4] La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)
- [5] Presque toujours ou toujours ]

**Les 3 questions suivantes portent sur les érections que vous avez pu avoir pendant les rapports sexuels.**

3. Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois, lors d'une tentative de rapport, avez-vous été capable de pénétrer votre partenaire?

- [0] Aucune activité sexuelle
- [1] Presque jamais ou jamais
- [2] Quelques fois (beaucoup moins que la moitié du temps)
- [3] Parfois (environ la moitié du temps)
- [4] La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)
- [5] Presque toujours ou toujours

4. Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois, avez-vous été capable, lors des rapports, de maintenir l'érection après avoir pénétré votre partenaire?

- [0] Aucune activité sexuelle
- [1] Pratiquement jamais ou jamais
- [2] Quelques fois (beaucoup moins que la moitié du temps)
- [3] Parfois (environ la moitié du temps)
- [4] La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)
- [5] Pratiquement toujours ou toujours

5. Au cours des 4 dernières semaines, vous a-t-il été difficile, pendant le rapport, de maintenir une érection jusqu'à la fin du rapport?

- [0] Aucune tentative de rapport
- [1] Extrêmement difficile
- [2] Très difficile
- [3] Difficile
- [4] Légèrement difficile
- [5] Pas difficile

15. Pour les 4 dernières semaines, comment qualifieriez-vous la confiance que vous aviez dans le fait de pouvoir obtenir et maintenir une érection?

- [1] Très faible
- [2] Faible
- [3] Moyenne
- [4] Elevée
- [5] Très élevée

**Références:** Rosen RC, Riley A, Wagner G et al.: The International Index of Erectile Function (IIEF): a multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. Urology 1997; 49 (6):822-830

**Sévérité de la DE selon IIEF**  
**Questions 1 – 5 et 15 (max. 30 points)**

Troubles sévères =	1 – 10
Troubles modérés	11 – 16
Troubles légers	17 – 25
Normal (aucune DE)	26 - 30