

# Comportement avant et après une opération au KSB

Anästhesie  
Sprechstunde  
Direkt +41 56 486 31 46  
[ipas.chirurgie@ksb.ch](mailto:ipas.chirurgie@ksb.ch)

## Informations pour les enfants

### Chers parents, chers enfants

Par votre participation active, vous pouvez contribuer à éviter des effets secondaires désagréables ou des complications, qui peuvent survenir à l'occasion de toutes les anesthésies. Veuillez nous aider à prévenir les incidents en vous conformant aux consignes de sécurité suivantes:

### Etre à jeun

De courtes périodes à jeun permettent d'améliorer le bien-être de votre enfant avant et après l'opération. Sauf mention contraire, les règles suivantes s'appliquent pour être à jeun:

#### Admission le jour de l'opération

- Nourrissons (jusqu'à 1 ans)
  - Réveillez votre enfant la nuit et, 4 heures avant l'opération, faites-lui boire du lait en poudre au biberon ou, 3 heures avant l'opération, du lait maternel.
  - Si votre enfant est déjà habitué à boire du thé/de l'eau, faites-lui boire du liquide clair comme du thé sucré ou de l'eau 1 heure avant son admission (pas de lait/crème, pas de pulpe de fruits).
- Enfants (> 1 an)
  - Réveillez votre enfant 1 heure avant l'admission et faites-lui boire du thé sucré ou de l'eau (pas de lait/crème, pas de pulpe de fruits).
  - Max. 200 ml de lait/lait chocolaté sont autorisés jusqu'à 4 heures avant l'admission
  - La nourriture solide sont autorisés jusqu'à 6 heures avant l'admission.

#### Admission un jour avant l'opération

- Sauf mention contraire, votre enfant n'a pas besoin d'être à jeun lors de l'admission.

### Vos propres médicaments

Le jour de l'admission, munissez-vous de tous les médicaments que votre enfant doit prendre. Le matin, administrez vos propres médicaments à votre enfant comme suit.

Médicaments:

---

---

---

---

### Vaccins

Les vaccins peuvent avoir des effets secondaires et influencer sur l'état de santé général de votre enfant. C'est pourquoi il est recommandé de prévoir un laps de temps suffisant entre le vaccin et l'opération, resp. l'anesthésie:

- 3 semaines après le vaccin contre les oreillons, rougeole, rubéole, varicelle, fièvre jaune
- 1 semaine après le vaccin contre la diphtérie, tétanos, coqueluche (Pertussis), poliomyélite, Haemophilus influenzae de type B, hépatite A/B, papillomavirus humains, grippe (influenza), pneumocoques, méningocoques, méningo-encéphalite printanière, rage, COVID

Si la date de l'opération de votre enfant se situe pendant ce laps de temps de sécurité après la vaccination, nous vous prions de bien vouloir nous contacter afin de repousser la date de l'opération. Mais les vaccinations doivent impérativement être effectuées dans les délais. Après une opération/anesthésie, nous recommandons un laps de temps de sécurité d'une semaine avant la prochaine vaccination.

### Bijoux, objets de valeur et lunettes/ lentilles de contact

- Laissez les bijoux et autres objets de valeur à la maison.
- L'électronique de loisir raccourcit le séjour à l'hôpital mais on peut la perdre facilement. Choisissez donc soigneusement ce que vous souhaitez emporter à l'hôpital. Si une anesthésie locale est prévue pour les enfants d'un certain âge, il est permis d'emporter un



lecteur mobile (lecteur MP3, Smartphone en mode avion) dans le bloc opératoire. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de perte ou de dommages.

- Les piercings peuvent occasionner des brûlures. Si vous pouvez les retirer, veuillez les laisser chez vous, sinon vous devrez attirer l'attention des médecins sur vos piercings.
- Veuillez à ce que votre enfant arrive au bloc opératoire sans maquillage.
- Il est interdit d'emporter les lunettes et lentilles de contact dans le bloc opératoire. Exception: en cas de forte déficience visuelle, les enfants d'un certain âge peuvent emporter leurs lunettes dans le bloc opératoire. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de perte ou de dommages.

## Accompagnement parental dans le bloc opératoire

Au KSB, un parent a la possibilité d'accompagner l'enfant dans le service de chirurgie. Pour bon nombre d'enfants, la présence d'un parent est rassurante. Dès que votre enfant est endormi, vous quittez le service de chirurgie avec un accompagnateur bénévole volontaire pour que l'équipe chirurgicale puisse continuer à travailler tranquillement. Vous trouverez des informations supplémentaires sur l'accompagnement parental dans la brochure spéciale «Accompagnement parental dans le bloc opératoire». Les urgences et enfants de moins d'un an ne peuvent pas être accompagnés.

## Le jour de l'admission

- En fonction de l'âge, apportez des jouets, des animaux en peluche, des vêtements, du lait en poudre et des tétines.
- Le personnel soignant contrôlera si votre enfant est à jeun et son état de santé. Le personnel soignant effectuera les contrôles éventuellement nécessaires (tension artérielle, poids etc.).
- En général, votre enfant recevra un jus spécial pour le calmer avant l'opération.

## Après l'opération

- Après l'opération, votre enfant passera un certain temps en salle de réveil pour un contrôle permanent.
- Pendant ce temps, un parent peut rester auprès de l'enfant dans la salle de réveil jusqu'à ce qu'il soit transféré dans la clinique pédiatrique.

- Une infirmière diplômée assistera votre enfant pour sa première mobilisation. Veuillez attendre les instructions et un accompagnement correspondants.

## Règles comportementales après des opérations ambulatoires

- En fonction de l'intervention, votre enfant pourra rentrer à la maison le jour même.
- Veuillez tenir compte du fait que votre enfant ne sortira éventuellement de l'hôpital que tard dans la soirée.
- Avant de quitter l'hôpital, les points suivants doivent être remplis: état de veille en fonction de l'âge, mobilisation sans problème, alimentation normale sans nausées, pas de fortes douleurs.
- Après la sortie de l'hôpital, veuillez à ce que votre enfant ne fasse pas de sport et de gros efforts physiques pendant les 24 premières heures succédant l'opération.
- Problèmes à la maison : si des problèmes surviennent à la maison, comme de fortes douleurs, des nausées, un malaise ou si vous avez constaté un saignement, appelez le 056 486 21 11 (central téléphonique KSB) et demandez à être mis en contact avec le médecin-chef de service de la clinique pédiatrique.

Si votre enfant tombe malade avant l'opération, veuillez contacter l'anesthésiste au 056 486 31 44. Si l'opération doit être repoussée, veuillez contacter le secrétariat de la clinique où l'opération doit avoir lieu dès que votre enfant est guéri.

## Accord et confirmation

Le/la soussigné(e) confirme avoir lu et compris les directives ci-dessus. Le Kantonsspital Baden AG ne peut pas être rendu responsable des conséquences résultant du non-respect de ces directives.

Baden,

Date

Signature du patient/de la patiente/des parents  
ou du représentant