

KSB'de ameliyat öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Anästhesie
Sprechstunde
Direkt +41 56 486 31 46
ipas.chirurgie@ksb.ch

Çocuklar için bilgiler

Sayın anne baba ve çocuklar

İzleyeceğiniz tutum ile her anestezi esnasında gözle-
nebilecek yan etki ve beklenmedik komplikasyonların
engellenmesine önemli bir katkı sağlayabilirsiniz. Lütfen
sizde aşağıdaki güvenlik kurallarına titizlikle uyararak
istenmedik durumların engellenmesine yardımcı olunuz:

Açlık

Kısa aç kalma süreleri ameliyat öncesinde ve sonrasında
çocuğunuzun sıhhatini artırır. Şayet bir başka
anlaşmaya varılmamış ise, aşağıdaki açlık kuralları
geçerlidir:

Ameliyatın yapıldığı günün gelmesi

- Bebekler (1 yaşa kadar)
 - Çocuğunuzun geceleyin uyandırın girişten 4 saat önce
biberonla süt veya 3 saat önce anne sütü içiriniz.
 - Çocuğunuzun çay/su alışkanlığı edindiye, o zaman
girmeden 1 saat önce şekerli çay veya su gibi
durusivılar içirebilirsiniz (süt/süt kreması yok, meyve
parçaları yok).
- Çocuklar (> 1 yaş)
 - Çocuğunuzun girişten 1 saat önce uyandırın ve
tatlandırılmış çay veya su içirin (süt/süt kreması yok,
meyve parçaları yok).
 - Girmeden 4 saat öncesine kadar maks. 200 ml süt/
kakaolu süt için izin verilmektedir.
 - Sağlam beslenmeye girişten 6 saat öncesine kadar
izin verilir.

Ameliyattan bir gün önce giriş

- Eğer başka bir anlaşmaya varılmamışsa, çocuğunuz
aç karnına gelmek zorunda değildir.

Kendi ilaçları

Giriş gününde çocuğunuzun kullandığı bütün ilaçları
yanınızda getiriniz. Çocuğunuza kendi sabah ilaçlarını
aşağıdaki gibi veriniz.

İlaçlar:

Aşılar

Aşılar yan etkilere yol açabilmektedir ve çocuğunuzun
genel durumunu etkileyebilir. Bu nedenle, aşı ile ame-
liyat ya da anestezi arasında bir zamansal güvenlik
mesafesinin tutulması önerilmektedir:

- Kabakulak, kızamık, rubella, suçiçeği (varisella),
sarılımmaya karşı aşı sonrası 3 hafta
- Difteri, tetanos, boğmaca (pertussis), çocuk felci
(poliomyelit), hemofilus enflüanza tip B, hepatit A/B,
insanpapilloma virüsü, grip (enflüanza), pnömokok,
meningokok, erken yaz meningoensefalit kuduza
karşı aşı, COVID sonrası 1 hafta

Çocuğunuzun ameliyat tarihi aşı sonrası bu güvenlik
mesafesinin içinde düşerse, ameliyat tarihini yeniden
belirlemek üzere bizimle temasa geçiniz. Ancak aşılar
planlandığı şekilde yapılmalıdır. Bir ameliyat/anestezi
sonrası yapılacak bir sonraki aşı için bir haftalık bir
zamansal güvenlik mesafesinin tutulmasını öneririz.

Takı, değerli eşyalar ve görme yardımcıları

- Takı ve diğer değerli eşyaları evde bırakın.
- Eğlence elektroniği hastane günlük yaşantısını
kısıtlar, ama kolayca kaybolabilir. Bunun için itinalı
karar verin. Büyük çocuklarda sadece bir bölgesel
anestezi planlanmış ise, ameliyat odasına bir müzik
çalma aleti (MP3-Player, uçuş modunda akıllı telefon)
getirilebilir. Kaybolmaları veya zarar görmeleri halinde
her türlü sorumluluk reddedilir.
- Piercing'ler yanmalara yol açabilirler, eğer
çıkarılabilirlerse onları evde bırakın. Aksi takdirde



8 0 0 0 0 0 0 4 9 2

hekimlerindikkatine sunulmaları gerekir.

- Lütfen çocuğunuzun ameliyat odasına makyajsız gelmesine dikkat edin.
- Gözlükler ve kontak lensler getirilemezler. İstisna: aşırı görme engeli durumunda büyük çocuklar gözlükgetirebilirler. Kaybolmaları veya zarar görmeleri halinde her türlü sorumluluk reddedilir.

Ameliyatodasınaanne baba refakati

KSB'de anne babadan birinin çocuğa ameliyat bölümüne gitmesinde eşlik edebilme imkânı vardır. Anne babadan birinin bulunması birçok çocuk için sakinleştiricidir. Çocuğunuz kendinden geçer geçmez ameliyat ekibinin rahatsız edilmeden çalışmasına devam edebilmesi için gönüllü çalışan bir kişinin eşliğinde ameliyat bölümünü terk edersiniz. Anne baba refakati ile ilgili başkaca bilgileri «ameliyat odasında ebeveyn refakati» özel broşüründe bulabilirsiniz. Acil durumlara ve bir yaş altı çocuklara refakat edilemez.

Giriş gününde

- Lütfen çocuğun yaşına göre oyuncaklar, peluş hayvanlar, kıyafetler, biberon maması ve emzik getirin.
- Açlık ve sağlık durumu bakıcı personel tarafından kontrol edilir ve yapılmamış olan gerekli ölçümler (kanbasıncı, ağırlık vs.) gerçekleştirilir.
- Normalde çocuğunuza ameliyattan önce bir sakinleştirici sıvı verilir.

Ameliyattan sonra

- Çocuğunuz ameliyattan sonra bir süre sıkı gözetim için yoğun bakım odasına alınır.
- Bu zaman sürecinde anne babadan biri çocuk kliniğine alınana kadar yoğun bakım odasında çocuğa refakat edebilir.
- Çocuğunuzun ilk ambulasyonunda yetkili bakıcı kişi yardımcı olacaktır. Lütfen ilgili bilgilendirme ve refakat için bekleyiniz.

Ayakta müdahale sonrası davranış kuralları

- Yapılan müdahaleye göre çocuğunuzun aynı gün eve gitmesi mümkündür.
- Lütfen çıkışın akşamın geç vaktine kadar uzayabileceğine dikkat ediniz.
- Çıkış için aşağıdaki noktaların yerime getirilmiş olmaları gerekmektedir: Yaşa uygun olarak uyanma durumu, sorunsuz hareketlilik, bulantı olmadan normal besin alabilme, yoğun ağrıların olmaması.
- Çıkıştan sonra çocuğun ameliyatta sonra ilk24 saatspordan ve bedene fazla yüklenmekten kaçının.
- Evde karşılaşılan sorunlar: Evde şiddetli ağrılar, bulantı, rahatsızlık gibi sorunlar meydana gelirse veya birkanama tespit ederseniz, 056 486 21 11 (KSB Santrali) numaralı telefondan arayın ve çocuk kliniğindeki görevli baş asistanı bağlatın.

Çocuğunuz ameliyattan önce hastalanırsa, 056 486 31 44 numaralı telefondan anestezi hekimiyle bağlantı kurunuz. Ameliyatın ertelenmesi gerektiğinde, çocuğunuzun tekrar iyileşmesiyle birlikte ameliyatın yapılacağı klinik sekreterliğine başvurun.

Kabul ve Onay

Aşağıda imzası bulunan şahıs yukarıdaki yönergeleri okuyup anladığını onaylar. Bu yönergelerin dikkate alınmamasından dolayı Kantonsspital Baden AG sorumlu tutulamaz.

Baden,

Tarih

Hastanın/anne babanın/yasal temsilcinin imzası