

Anestesia

Explicação e autorização

Anästhesie
Sprechstunde
Direkt +41 56 486 31 46
ipas.chirurgie@ksb.ch

Estimados pacientes, estimados pais,

Para podermos realizar com êxito e sem dor, em si (ou na sua filha ou no seu filho), a operação planeada, é necessário aplicar o respetivo método anestésico (narcose). Um ou uma anestesista irá definir, pessoalmente, consigo, qual a anestesia que melhor se adequa ao seu caso e menos perturbações lhe poderá causar. Também irá receber informações sobre o decurso da anestesia e sobre as vantagens e desvantagens dos diversos métodos de anestesia. Pedimos-lhe que faça todas as perguntas em que tiver dúvidas sobre a anestesia, anotando as suas perguntas no verso desta folha.

Os métodos anestésicos

Todos os métodos anestésicos têm riscos especiais, sobre os quais queremos informá-la/o. De uma maneira geral, é muito raro ocorrerem graves complicações. Apesar disso, temos de lhe chamar a atenção para riscos gerais e específicos.

Riscos gerais: complicações das vias respiratórias ou do sistema cardiovascular, reações alérgicas, danos de posicionamento (afeções nervosas), retenção urinária, náuseas, vômitos, prurido, tremuras de frio, equimose, dores de costas.

Anestesia geral

Mediante uma anestesia geral são desligados as sensações de dor e a consciência por meio de diversos medicamentos durante tanto tempo até a intervenção cirúrgica estar concluída. Neste caso, regra geral, é preciso ajudar artificialmente a respiração, o que você não sentira porque está adormecida/o.

Riscos específicos: náuseas e vômitos, com problemas pulmonares (aspiração), problemas nos dentes, nos olhos e danos de posicionamento e nas mucosas, na laringe e nas cordas vocais, rouquidão, dificuldade na deglutição, tremores de frio, dificuldades em urinar. Falha de um método anti-concepcional hormonal (pílula ou similar).


Anestesia local

Em muitas operações, existe a possibilidade de ser anestesiada somente a parte do corpo onde tem de ser realizada a operação. Durante esta anestesia local, você pode permanecer acordada/o, ouvir música através dos auscultadores ou dormir após ter tomado soporíferos. Se o efeito da anestesia local for insuficiente podem ser adicionados em qualquer altura analgésicos ou também recorrer a uma anestesia geral.

Anestesia regional central: anestesia espinal, epidural ou peridural

Um medicamento para anestesia local (agente anestésico local) é injetado no líquido que se encontra à volta da medula espinal (anestesia espinal) ou no espaço livre entre a medula espinal e o canal da vértebra (anestesia epidural ou peridural). Durante um determinado espaço de tempo são aquecidas as partes do corpo assim tornadas indolores que depois ficam insensíveis, podendo só mover-se muito limitadamente ou não podendo mesmo mover-se. A anestesia epidural ou peridural pode ser combinada com uma anestesia geral.

Riscos específicos: hematoma, danos nos vasos sanguíneos, problemas pulmonares e danos neuronais, complicações respiratórias, cardíacas, circulatórias, reações alérgicas, infecções, abscesso, paraplegia, vômitos com problemas pulmonares (aspiração), dores de cabeça, dificuldades em urinar, fracasso do método e recurso a anestesia geral.



Anestesia local periférica: anestesia de bloqueio de nervos

Isto são atordoamentos de nervos isolados ou de troncos nervosos de nervos com um agente de anestesia local, por exemplo, o atordoamento para o braço e a mão mediante sobre-injeção dos nervos na axila (bloqueio do plexo axilar).

Riscos específicos: hematoma, danos nos vasos sanguíneos, problemas pulmonares e danos neuronais, complicações respiratórias, cardíacas, circulatórias, reações alérgicas, infecção, abscesso, paraplegia, fracasso do método e recurso a anestesia geral.

Anestesia combinada (anestesia local e geral)

Nas intervenções cirúrgicas maiores e em operações em crianças são frequentemente combinados os dois métodos de anestesia e simultaneamente utilizados, para facilitar o tratamento da dor no período pós-operatório.

Aplicação de tranquilizantes (sedação) assim como anestesia local aplicada por cirurgiã ou cirurgião

São poucas as operações realizadas por cirurgiãs ou cirurgiões só com atordoamento local. A equipa de anestesistas manter-se-á a controlá-la/lo como se tivesse sido aplicada uma anestesia geral ou local, para que lhe possam ser dados, se for necessário, analgésicos ou tranquilizantes.

Outros instrumentos de controlo suplementar

- Catéter central venoso: introdução na maior parte dos casos no pescoço ou por baixo da clavícula.
Riscos: danos nos vasos sanguíneos, nervos, coração, diafragma, pneumotórax com rara necessidade de introdução de um dreno, infecção, abscesso, septicémia, trombose, embolia
- Catéter arterial: introdução efetuada na maior parte dos casos na artéria do pulso (a. radialis)
Riscos: danos nos vasos sanguíneos e nos nervos, perturbações vasculares, infecção, abscesso
- Catéter das vias urinárias
Riscos: infecção, ferimento das vias urinárias, estreitamento dos ureteres
- Transfusão de sangue: indicação correta rigorosa!
Riscos: infeções, reações de rejeição, febre, confusões e transfusões erradas
- Unidade de cuidados intensivos: depois da operação está planeada uma estadia na unidade de cuidados intensivos, ou é possível dependendo de como tenha decorrido a operação.

Perguntas, observações

Autorização

Confirmo que fui detalhadamente informada/o sobre o método de anestesia planeado, assim como eventualmente sobre medidas necessárias alargadas numa conversa de esclarecimento. Durante isso, tive oportunidade de fazer as perguntas que me pareciam importantes sobre os riscos especiais e possíveis complicações, assim como sobre outras medidas e acompanhamento (por ex., transfusão de sangue) e os seus riscos assim como métodos alternativos. Não tenho mais perguntas a fazer, sinto que estou suficientemente informada/o e autorizo por este meio a intervenção cirúrgica planeada com o método de anestesia discutido. Declaro estar igualmente de acordo com qualquer alteração que seja necessária do ponto de vista médico ou um prolongamento do método de anestesia combinado ou com outras medidas e acompanhamento necessários. Sobre riscos que só muito raramente podem ocorrer, não falamos com a ou o paciente numa conversa normal de esclarecimento a não ser que isso seja pedido especificamente pela ou pelo paciente. Além disso, confirmo que concordo que meus dados possam ser passados de acordo com os requisitos legais para fins estatísticos e de qualidade para o Banco de Dados de Qualidade de Anestesia da Suíça de forma anónima (tipo de procedimento, tipo de anestesia, tempos requeridos).

Data

Hora, duração

Pessoas presentes

Assinatura da ou do paciente/dos pais

Assinatura da médica/do médico anestesista